

**О РЕЗОЛЬВЕНТЕ ОПЕРАТОРА ДИРАКА  
С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ**

**Киселева Анна Викторовна**

*Студент*

*Математический факультет Воронежского государственного университета,  
Воронеж, Россия*

*E-mail: anyutka.kiseleva@gmail.com*

**Научный руководитель** — *Бурлуцкая Мария Шаукатовна*

В пространстве вектор-функций  $z(x) = (z_1(x), z_2(x))^T$  ( $T$  — знак транспонирования) с непрерывно-дифференцируемыми компонентами рассматривается оператор  $L$ , заданный дифференциальным выражением

$$(Lz)(x) = l[z](x) = Bz'(x) + Q(x)z(x),$$

где  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $Q(x) = \begin{pmatrix} 0 & q_2(x) \\ q_1(x) & 0 \end{pmatrix}$ ,  $q_j(x) \in C[0, 1]$ , отвечающий периодическим краевым условиям

$$z(0) = z(1).$$

Оператор  $L$  является частным случаем оператора Дирака [1]. Спектральные вопросы для оператора  $L$  (асимптотические формулы для собственных значений и собственных функций, вопросы базисности, теоремы равносходимости и др.) изучались в работах [2]–[6]. В [7] методом Фурье исследовалась смешанная задача для системы уравнений в частных производных, приводящая к системе Дирака, но с краевыми условиями типа Дирихле  $z_1(0) = z_2(0)$ ,  $z_1(1) = z_2(1)$ . В задаче с периодическими условиями применение техники из [7] затруднительно, так как здесь собственные значения могут быть кратными, и нет необходимой информации о собственных функциях. Для использования в случае такой задачи подходов из [8], основанных на представлении суммы ряда Фурье через контурные интегралы от резольвенты соответствующего оператора, требуется исследование резольвент оператора  $L$  и простейшего (невозмущенного) оператора  $(L^0z)(x) = Bz'(x)$ ,  $z(0) = z(1)$ .

Легко устанавливается, что собственные значения оператора  $L^0$  двукратны:  $\lambda_n = 2\pi n$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ). Уточненная асимптотика для собственных значений оператора  $L$  приведена в [4, Теоремы 3, 4].

Обозначим  $R_\lambda = (L - \lambda E)^{-1}$ ,  $R_\lambda^0 = (L^0 - \lambda E)^{-1}$  резольвенты операторов  $L$  и  $L^0$  ( $E$  — единичный оператор,  $\lambda$  — спектральный

параметр).

**Теорема 1.** Для  $z = R_\lambda^0 f$ , где  $z = (z_1, z_2)^T$ ,  $f = (f_1, f_2)^T$ , справедливы следующие формулы:

$$z_k = z_k(x, \lambda) = \Omega_k^0(x, \lambda, f) + (M_{k\lambda}^0 f_k)(x), \quad k = 1, 2, \quad \text{где}$$

$$\Omega_1^0(x, \lambda, f) = \frac{e^\lambda}{1-e^\lambda} (e^{-\lambda t}, f_1(t)) e^{\lambda x}, \quad \Omega_2^0(x, \lambda, f) = \frac{1}{1-e^\lambda} (e^{\lambda t}, f_2(t)) e^{-\lambda x},$$

$$(M_{k\lambda}^0 f_k)(x) = (-1)^{k-1} \int_0^x e^{(-1)^{k-1}\lambda(x-t)} f_k(t) dt, \quad (f, g) = \int_0^1 f(t)g(t) dt.$$

В докладе также будет представлена удобная для дальнейших исследований формула для резольвенты оператора  $L$  и оценки ее компонент.

### Литература

1. Левитан Б. М., Саргсян И. С. Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака. М.: Наука, 1988.
2. Джаков П. В., Митягин Б. С. Зоны неустойчивости одномерных периодических операторов Шредингера и Дирака // Успехи мат. наук. 2006. Т. 61, № 4. С. 77–182.
3. Баскаков А. Г., Дербушев А. В., Щербаков А. О. Метод подобранных операторов в спектральном анализе несамосопряженного оператора Дирака с негладким потенциалом // Изв. РАН. Серия матем. 2011. Т. 75, № 3. С. 3–28.
4. Бурлуцкая М. Ш., Корнев В. В., Хромов А. П. Система Дирака с недифференцируемым потенциалом и периодическими краевыми условиями // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012. Т. 52, № 9. С. 1621–1632.
5. Савчук А. М., Садовничая И. В. Асимптотические формулы для фундаментальных решений системы Дирака с комплекснозначным суммируемым потенциалом // Дифференциальные уравнения. 2013. Т. 49, № 5. С. 573–584.
6. Savchuk A. M., Shkalikov A. A. Dirac operator with complex-valued summable potential // Mathematical Notes. 2014. V. 96, № 5. P. 777–810.
7. Бурлуцкая М. Ш. Классическое и обобщенное решение смешанной задачи для системы уравнений первого порядка с непрерывным потенциалом // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2019. Т. 59, № 3. С. 380–390.
8. Бурлуцкая М. Ш., Хромов А. П. Резольвентный подход для волнового уравнения // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2015. Т. 55, № 2. С. 51–63.